



Agromet Advisory Bulletin

Date : 12-11-2020

Weather Forecast of KUHI Block in NAGPUR(Maharashtra) Issued On :2020-11-12(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date (y-m-d)	Rainfall (mm)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RH I (%)	RH II (%)	Wind Speed (kmph)	Wind Direction (Degree)	cloud cover (Octa)
2020-11-13	0.0	33.1	18.8	73	48	10.0	66	3
2020-11-14	0.0	33.4	18.1	65	42	8.0	63	2
2020-11-15	0.0	33.3	17.5	66	35	9.0	63	0
2020-11-16	0.0	33.2	17.9	64	35	9.0	30	0
2020-11-17	0.0	33.4	18.1	60	35	8.0	62	2

Weather Summary/Alert:

In Kuhi block, as per forecast given by, RMC, Nagpur, sky will be clear to partly cloudy and weather will be dry during next five days is forecasted.

कुही तालुक्यामध्ये, प्रादेशिक हवामान केंद्र नागपूर च्या अंदाजानुसार, पुढील पाच दिवस आकाश निरभ्र ते आंशिक ढगाळ आणि हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

General Advisory:

Partly cloudy weather is expected during next five days, If the Infestation of small pod borer larva (*Helicoverpa armigera*) on Arhar crop on inflorescences and flower and crosses ETL (10 to 20 larvae per 10 plants) spraying should be done of Emamectin benzoate 5 SG 3 gm or Chlorantraniliprole 18.5 % SC mix with in 2.5 ml per 10 liters of water and spray.

पुढील पाच दिवस आकाश आंशिक ढगाळ राहण्याची शक्यता असल्याने तूर पिकामध्ये लहान अवस्थेतील शेंगा पोखरणान्या अळीचा प्रादुर्भाव पिक कळी आणि फुलोरा अवस्थेत आल्यास आणि किडीने आर्थिक नुकसान पातळी गाठल्यास (१० ते २० अब्या प्रती १० झाडे) इमामेक्टीन बेन्झॉएट ५ एसजी ३ ग्राम किंवा क्लोरानट्रॉनिलिप्रोल १८.५ टक्के एससी. २.५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

SMS Advisory:

Precautions should be taken for crop and livestock management as possible rise in temperature, partly cloudy skies and dry weather are expected in the next five days.

पुढील पाच तापमानातील संभाव्य वाढ, आंशिक ढगाळ आकाश आणि कोरडे हवामान अपेक्षित असल्याने पिक व जनावरांच्या व्यवस्थापनाबाबतीत खबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात.

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
GARLIC	Garlic: Seed rate for garlic is 400-500 kg/ha. Selected cloves should be planted vertically 2 cm below soil surface with plant to plant spacing of 10 cm and row to row spacing of 15 cm.

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	लसून: लसून लागवडीसाठी ४००-५०० किलो लसून पाकळ्या प्रती हेक्टर वापराव्या. निवडलेल्या पाकळ्या जमिनीमध्ये दोन सेंटीमीटर खोल, दोन झाडातील अंतर १० सेंटीमीटर आणि दोन ओळीतील अंतर १५ सेंमी ठेवावे.
GARLIC	Garlic: Apply 100 kg N, 50 kg P and 50 kg K per hectare of garlic crop. Half of this nitrogen, full phosphorus and full potash should be given at the time of planting and the remaining half should be given 30 days after planting. Also apply 30 kg of sulfur from the soil. लसून: लसून पिकास हेक्टरी १०० किलो नत्र, ५० किलो स्फुरद आणि ५० किलो पालाश द्यावे. यापैकी अर्धा नत्र, पूर्ण स्फुरद आणि पूर्ण पालाश लागवडीचे वेळी व राहिलेला अर्धा नत्र लागवडीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे. तसेच ३० किलो गंधक जमिनीतून द्यावे.
CHICK PEA	Chickpea: Deshi varieties and seed rate of chickpea for sowing- Hirawa Chafa (AKGS-1), Vijay and ICCV-10 (50-60 kg/ha seed), PKV Harita (AKG- 9303-12) and JAKI- 9218 (75-85 kg/ha seed), Kabuli varieties and seed rate of chickpea, PKV Kabuli-2 & PKV Kabuli-4 (110-115 kg/ha seed), Pink chickpea variety and seed rate, Gulak-1 (75-85 kg/ha seed) are recommended for sowing up to second fortnight of October to 15th November and sowing of PKV Kanchan (AKG- 1909) (50-60 kg/ha seed) variety of chickpea up to 15th November. हरभरा: हरभरा पिकाचे पेरणीकरिता देशी वाण आणि बियाणे दर - हिरवा चाफा (एकेजीएस-१), विजय आणि आयसिसिद्धी- १० (५०-६० किलो बियाणे प्रती हेक्टर), पिकेव्ही हरिता (एकेजी- ९३०३- १२) आणि जाकी ९२१८ (७५- ८५ किलो बियाणे प्रती हेक्टर बियाणे), काबुली वाण आणि बियाणे दर पिकेव्ही काबुली- २ आणि पिकेव्ही काबुली- ४ (११०- ११५ किलो बियाणे प्रती हेक्टर), गुलाबी हरभरा वाण गुलक- १ (७५-८५ बियाणे प्रती हेक्टर) या प्रमाणात १५ ऑक्टोबर ते १५- ३० नोव्हेंबर पर्यंत पेरणी करावी. पिकेव्ही कांचन (एकेजी- १९०९) या वाणाची ५०-६० किलो बियाणे प्रती हेक्टर या प्रमाणात १५ नोव्हेंबर पर्यंत करावी.
CHICK PEA	Chickpea: Before sowing of gram seed, seed treatment should be done of 5 gm of Trichoderma or 2 gm of Thirum + 2 gm of Carbendazim per kg of seed, followed by 250 gm of Rhizobium (nitrogen fixing bacteria) and 250 gm of P. S. B. (Phosphorus Dissolving Bacteria) seed treatment should be done by mixing cold solution of jaggery per 10 kg seed. After seed treatment the seeds should be dried in the shade for an hour and then sown. हरभरा: हरभरा बियाण्यास पेरणीपूर्वी प्रती किलो बियाण्यास ५ ग्राम ट्रायकोडर्मा किंवा २ ग्राम थायरम + २ ग्राम कार्बेन्डाझिम बीजप्रक्रिया, यानंतर २५० ग्राम रायझोबियम (नत्र स्थिरीकरण करणारे जिवाणू) आणि २५० ग्राम पी. एस. बी. (स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू) प्रती १० किलो बियाण्यास गुळाच्या थंड द्रावणात मिसळून बीज प्रक्रिया करावी. बीज प्रक्रिया केल्यानंतर तासभर सावलीत सुकवावे आणि मग पेरणी करावी.
SAFFLOWER	Safflower: Safflower crop should be thinned at 10 to 12 days after germination. Keep a distance of 20 to 30 cm between two plants. करडई: करडई पिकामध्ये उगवणीनंतर १० ते १२ दिवसांनी विरळणी करावी. दोन रोपांमध्ये २० ते ३० सेंमी अंतर ठेवावे.
COTTON	Cotton: The first three picked cotton of dryland cotton and the first four picked cotton of irrigated cotton are of good quality. This cotton should be stored separately if possible. कपाशी: कोरडवाहू कपाशीच्या पहिल्या तीन वेचण्यांचा तसेच बागायती कपाशीच्या मधल्या चार वेचण्यांचा कापूस दर्जेदार असतो. हा कापूस शक्यतो वेगळा साठवावा.
COTTON	Cotton: Farmers are advised to give priority for clean picking of cotton. Keep the picked cotton, variety wise. In cotton, first picking should be done after 20 to 30 % bolls are burst, then second and third picking should be done at intervals of 10 to 15 days.

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	<p>कपाशी: शेतकरी बांधवांनी कपाशीच्या वेचनीच्या कामाला प्राधान्य द्यावे. वाणानुसार वेचणी केलेला कापूस कोरड्या आणि सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावा. कपाशीमध्ये २० बोंडे ३० टक्के बोंडे फुटल्यानंतर पहिली वेचणी करावी त्यानंतर १० ते १५ दिवसांच्या अंतराने दुसरी व तिसरी वेचणी करावी.</p>
COTTON	<p>Cotton: Erect 2 Pheromone traps per hectare for monitoring of Pink bollworm infestation. Rosette flowers should be plucked and destroyed. If the infestation of pink bollworm crosses ETL, take up spray of Thiodicarb 75 % WG 20 gm or spray Lambda Cyhalothrin 5 EC @ 10ml or Thiodicarb 75 % WP @ 20 g or Cypermethrin 10 EC @ 10 ml or Profenophos 30 ml or Emamectin benzoate 5 SG @ 5g per 10 litre of water.</p> <p>कपाशी: गुलाबी बोंड अळीच्या निरीक्षणासाठी प्रती एकर दोन फेरोमोन सापळे लावावेत. प्रादुर्भाव ग्रस्त डोमकळी काढून नष्ट कराव्या. कपाशीमध्ये गुलाबी बोंड अळी/प्रादुर्भावाने आर्थिक नुकसान पातळी गाठली असल्यास व्यवस्थापनासाठी थायोडीकार्ब ७५ % डब्ल्यूपी २० ग्राम किंवा लॅंबडा सायहॅलोथ्रिन ५ ईसी १० मिली किंवा सायपरमेथ्रीन १० ईसी किंवा प्रोफेनोफॉस ३० मिली किंवा ईमामेक्टीन बेन्झोएट ५ एसजी ५ ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p>
COTTON	<p>Cotton: To avoid the rotting of matured bolls from outer side, it is advised to undertake spray of Propiconazole 25% EC@ 1 ml or Propineb 70 WP @ 2.5-3 gm per liter of water. For internal rotting of bolls, spray Copper Oxychloride 50 WP 25 gm + Streptomycin 2 g per 10 litre of water.</p> <p>कपाशी: कपाशीमध्ये बाह्य बोंड सड रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रोपिकोनाझोल २५ % ईसी १ मिली किंवा प्रोपिनेब ७० डब्ल्यूपी २.५ ते ३ ग्राम प्रती १ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. कपाशीमध्ये आंतरिक बोंड सड रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी कॉपर ऑक्सिक्लोराईड ५० डब्ल्यूपी + स्ट्रेप्टोमाइसिन २ ग्राम प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p>
COTTON	<p>Cotton: For the management of Myrothecium leaf spot/grey mildew/ Corynespora leaf spot/leaf spot/anthracnose/external boll rot, it is advised to undertake foliar spray Carbendazim 50 WP @ 20 g or Kresoxim-methyl 44.3 SC @10 ml or Pyraclostrobin 5% + Metiram 55% WG or Propiconazole 25 EC @10 ml or Propineb 70 WP@25-30 g or Azoxystrobin 18.2% w/w+Difenoconazole11.4% w/w SC@ 10 ml or Fluxapyroxad 167 g/l + Pyraclostrobin 333 g/l SC@ 6 g in 10 litres of water is recommended.</p> <p>कपाशी: कपाशीवरील मायरोथेसियम बुरशीजन्य ठिपके/दह्या/कोरीनिस्पोरा बुरशीजन्य ठिपके/ पानावरील ठिपके आणि अँथ्रॅकनोज या बुरशीजन्य रोगांच्या व्यवस्थापनासाठी कार्बेन्डाझीम ५० डब्ल्यूपी २० ग्राम किंवा क्रेसोक्झीम- मिथिल ४४.३ एससी १० मिली किंवा मेटिराम ५५ % + पायराक्लोस्ट्रोबिन ५ % डब्ल्यूजी @ २० ग्रॅम १० किंवा प्रोपिकोनाझोल २५ % ईसी @ १० मिली किंवा प्रोपिनेब ७० % डब्ल्यूपी @ २५-३० ग्रॅम किंवा आझोक्सीस्ट्रोबिन १८.२ % ww + डायफेनकोनाझोल ११.४ % ww एससी १० मिली किंवा फ्लूक्सापायरोक्साड १६७ g/l + पायराक्लोस्ट्रोबिन ३३३ g/l एससी ६ ग्राम १० लिटर पाण्यात फवारणी करावी.</p>
PIGEON PEA (RED GRAM/ARHAR)	<p>Arhar: As a precautionary measure in the context of cloudy weather for management of pest, spray 5 % neem extracts AAzadiractin 300 ppm 50 ml in 10 liters of water as soon as buds and flowers appear on the arhar crop.</p> <p>तूर: तूर पिकाला कळ्या आणि फुले लागताच कीड व्यवस्थापनासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ५ टक्के निंबोळी अर्क अझाडीराक्टिन ३०० पीपीएम ५० मिली अधिक १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p>
PIGEON PEA (RED GRAM/ARHAR)	<p>Arhar: if the Infestation of small pod borer larva (Helicoverpa armigera) on Arhar crop on inflorescences and flower and crosses ETL (10 to 20 larvae per 10 plants) spraying should be done of Emamectin benzoate 5 SG 3 gm or Chlorantraniliprole 18.5 % SC mix with in 2.5 ml per 10 liters of water and spray.</p>

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	<p>तूर: तूर पिकामध्ये लहान अवस्थेतील शेंगा पोखरणाऱ्या अळीचा प्रादुर्भाव पिक कळी आणि फुलोरा अवस्थेत किडीने आर्थिक नुकसान पातळी गाठल्यास (१० ते २० अब्ज्या प्रती १० झाडे) इमामेक्टीन बेन्झॉएट ५ एसजी ३ ग्राम किंवा क्लोरानट्रॅनिलिप्रोल १८.५ टक्के एससी. २.५ मिली प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.</p>
WHEAT	<p>Wheat: Wheat crop should be irrigated first at 18 to 20 days after sowing at crown root initiation stage. Water stress at CRI stage reduces production by up to 33 %.</p> <p>गहू: गहू पिकास पेरणीनंतर १८ ते २० दिवसानंतर मुकुट मुळे फुटण्याच्या अवस्थेत पहिले पाणी द्यावे. या अवस्थेत पाण्याचा ताण बसल्यास ३३ टक्के पर्यंत उत्पादनात घट येऊ शकते.</p>
WHEAT	<p>Wheat: Varieties should be AKDW 1071 (Purna), AKDW 3722 (Vimal), HD 2189 and HD 2380 for timely sowing of irrigated wheat, Varieties should be PDKV Sardar (AKAW 4210-6), AKAW 4627, AKAW-381, AKAW 1071 (Purna) and HI 977 for late sowing of irrigated wheat.</p> <p>गहू: बागायती गहू वेळेवर पेरणीसाठी एकेडीडब्लू १०७१ (पूर्णा), एकेडीडब्लू ३७२२ (विमल), एचडी २१८९ आणि एचडी २३८० या वाणाची निवड करावी. बागायती गहू उशिरा पेरणीसाठी पिडीकेव्ही सरदार (एकेएडब्लू ४२१०-६), एकेएडब्लू ४६२७, एकेएडब्लू- ३८१, एकेएडब्लू १०७१ (पूर्णा) आणि एचआय ९७७ या वाणाची निवड करावी.</p>
WHEAT	<p>Wheat: Irrigated wheat should be sown in the first fortnight of November. Use 100 kg seed per hectare for timely sowing of irrigated wheat crop. For late sowing of irrigated wheat 150 kg seed per hectare should be used for sowing. For coarse seed varieties like HD 2189 or Purna of wheat crop, 125 kg seed per hectare should be used.</p> <p>गहू: बागायती गहू पिकाची पेरणी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात करावी. बागायती गहू पिकाच्या वेळेवर पेरणीसाठी १०० किलो बियाणे प्रती हेक्टर या प्रमाणात वापरावे. बागायती उशिरा गहू पेरणीसाठी प्रती हेक्टरी १५० किलो बियाणे पेरणीसाठी वापरावे. गहू पिकाच्या एचडी २१८९ किंवा पूर्णा यासारख्या जाड दाण्यांच्या वाणांसाठी बियाणे दर प्रती हेक्टरी १२५ किलो वापरावे.</p>
WHEAT	<p>Wheat: Irrigated wheat sowing should be done by giving irrigation if there is not enough moisture and then after wafsa conditions. 23 cm in two rows for sowing for irrigated wheat and 15 to 18 spacing in two rows for late sowing. Care should be taken not to fall deeper than 5 to 6 cm at the time of sowing wheat.</p> <p>गहू: बागायती गहू पेरणी पुरेसा ओलावा नसल्यास ओलीत करून नंतर वाफसा परिस्थिती आल्यानंतर करावी. बागायती वेळेवर पेरणीसाठी दोन ओळीमध्ये २३ सेंमी आणि बागायती उशिरा पेरणीसाठी दोन ओळीमध्ये १५ ते १८ अंतर ठेवावे. गहू पेरणी वेळी ५ ते ६ सेंमी पेक्षा खोल पडणार नाही याची काळजी घ्यावी.</p>
WHEAT	<p>Wheat: Before sowing, wheat seeds should be treated with 2.5 g / kg of Thirum or Vitavax 75 % WS. As well as Azotobacter (Nitrogen fixing bacteria) and Phosphorus solubilizing bacteria fertilizer at the rate of 250 g / 10 to 12 kg of seed.</p> <p>गहू: गहू बियाण्यास पेरणीपूर्वी थायरम किंवा विटावॅक्स ७५ टक्के पाण्यात मिसळणारी भुकटी २.५ ग्राम प्रती किलो त्याचबरोबर अँझोटोबॅक्टर हे नत्र स्थिरीकरण करणारे जीवाणू संवर्धन आणि स्फुरद विरघळविणारे जीवाणू खत प्रत्येकी २५० ग्राम प्रती १० ते १२ किलो बियाण्यास लावून बीजप्रक्रिया करावी.</p>
WHEAT	<p>Wheat: Apply 100 to 120 kg N, 50 to 60 kg P and 50 to 60 kg K per hectare for timely sowing of irrigated wheat and 80 kg N, 40 kg P and 40 kg K per hectare for late sowing wheat. For both irrigated and late sowing, apply half dose of nitrogen as well as full phosphorus and potash at the time of sowing and the remaining half dose at the time of first irrigation (18 to 20 days after sowing).</p>

Crop(Varieties)	Crop Specific Advisory
	गहू: बागायती गहू वेळेवर पेरणीसाठी प्रती हेक्टर १०० ते १२० किलो नत्र, ५० ते ६० किलो स्फुरद आणि ५० ते ६० किलो पालाश व बागायती उशिरा पेरणीसाठी ८० किलो नत्र, ४० किलो स्फुरद व ४० किलो पालाश या प्रमाणात रासायनिक खतांची मात्रा द्यावी. बागायती वेळेवर आणि उशिरा या दोन्ही पेरणीसाठी नत्राची अर्धी मात्रा तसेच संपूर्ण स्फुरद आणि पालाश पेरणीच्या वेळी द्यावे व उरलेली नत्राची अर्धी मात्रा पहिल्या पाण्याचे पाळीच्या वेळी (१८ ते २० दिवसानंतर) द्यावी.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture(Varieties)	Horticulture Specific Advisory
ONION	Onion: About 5-7 kg seeds are required to raise seedlings for one hectare. Before sowing, seeds should be treated with thiram @ 2 g/kg of seed to avoid damage from damping off disease. Application of Trichoderma viride @ 1,250 g / ha is also recommended to manage damping off and raise healthy seedlings. Seeds should be sown in lines at 50 mm to 75 mm apart to facilitate the removal of seedlings for transplanting, quick weeding, spray of pesticides etc. कांदा: कांदा पिकाच्या एक हेक्टर लागवडीकरिता ५ ते ७ किलो बियाणे वापरून रोपवाटिका तयार करावी. बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी बियाणे पेरणीपूर्वी थायरम २ ग्राम प्रती किलो बियाणे किंवा ट्रायकोडर्मा १२५० ग्राम प्रती हेक्टर या प्रमाणात बीज प्रक्रिया करावी. बियाण्याची पेरणी हि ओळीमध्ये ५० ते ७५ मिमी अंतरावर करावी जेणेकरून रोपे लावनिकरिता काढणे तसेच योग्य वेळी तन नियंत्रण आणि कीटक नाशक फवारणी साठी सुलभ होईल.
ONION	Onion: Onion crop should be given 100 kg N, 50 kg P and 50 kg K per hectare. Out of 100 kg N, Half Nitrogen (50 kg) and Full Phosphorus (50 kg) and Potash (50 kg) should be given at the time of planting and half nitrogen (50 kg) should be given 30 days after planting. Apply 30 kg sulphur per hectare through bentonite sulphur. कांदा: कांदा पिकास हेक्टरी १०० किलो नत्र, ५० किलो स्फुरद आणि ५० किलो पालाश द्यावे. १०० किलो नत्रापैकी अर्धा नत्र (५० किलो) व पूर्ण स्फुरद (५० किलो) व पालाश (५० किलो) लागवडीचे वेळी द्यावे आणि अर्धा नत्र (५० किलो) लागवडीनंतर ३० दिवसांनी द्यावे. प्रती हेक्टरी ३० किलो गंधकाची मात्रा बेन्टनाईट सल्फरच्या च्या माध्यमातून द्यावी.
SUNFLOWER	Sunflower: In sunflower crop, thinning should be done 10 to 15 days after germination and only vigorous seedlings should be kept in one place. सूर्यफूल: सूर्यफूल पिकामध्ये उगवणीनंतर १० ते १५ दिवसांनी विरळणी करावी आणि एका ठिकाणी एकाच जोमदार रोपटे ठेवावे.
ACID LIME	Acid lime: 1 to 4 year old acid lime orchard should be given 4 to 8 liters of water per plant, 5 to 7 year old tree 22 to 41 liters of water and 8 to 10 year old tree 53 to 75 liters of water per day per plant. लिंबू: १ ते ४ वर्ष वयाच्या लिंबाच्या बागेस प्रती झाड ४ ते ८ लिटर पाणी, ५ ते ७ वर्षांच्या झाडासाठी २२ ते ४१ लिटर पाणी आणि ८ ते १० वर्षांच्या झाडासाठी ५३ ते ७५ लिटर पाणी प्रती दिवस द्यावे.
ORANGE	Orange: During this month on Mrig Bahar (June flowering) Nagpur mandarin & Sweet orange (Mosambi) trees should be given water by drip irrigation or double ring method, For one year old tree give 8 litre/day/tree; for 4 yrs tree give 36 litres/day/tree; for 8 years old tree give 85 litres/day/tree and 10 to 25 years tree give 105 litre/day/tree

Horticulture(Varieties)	Horticulture Specific Advisory
	संत्रा: ठिबक संच असल्यास ल्याटरल पसराव्यात. आंबिया आणि मृग बहराच्या करिता संत्रा व मोसंबीच्या १ ते ४ वर्षांच्या झाडाला ९ ते ४० लिटर, ५ ते ७ वर्षांच्या झाडाला ५० ते ९० लिटर आणि ८ वर्ष तसेच ८ वर्षावरील झाडांना १०५ ते १३० लिटर पाणी प्रती दिवस द्यावे. ठिबक संच नसल्यास दुहेरी किंवा आळे पद्धतीने पाणी द्यावे.
ORANGE	Orange: Apply 500 gm urea, 600 gm single super phosphate, 150 gm muriate of potash along with 100 gm zinc sulphate, 100 gm ferrous sulphate, 100 gm manganese sulphate and 50 gm borax per tree to the orange plant where the fruit beard. संत्रा: संत्रा पिकाच्या ज्या झाडावर फळ आले आहे त्या झाडाला ५०० ग्राम युरिया, ६०० ग्राम सिंगल सुपर फोस्फेट, १५० ग्राम म्युरेट ऑफ पोटाश सोबत १०० ग्राम झिंक सल्फेट, १०० ग्राम फेरस सल्फेट, १०० ग्राम मँगनीज सल्फेट आणि ५० ग्राम बोरेक्स प्रती झाड या प्रमाणे द्यावे.
SWEET ORANGE	Orange and sweet orange: Apply 108 gms urea and 45 gms muriate of potash per tree to one year old tree of citrus and sweet orange. For two year old trees apply double the dose, three times for 3 year and 4 times for 4 year old trees and above. Every care should take to keep the soil moist during fertilizer application in order to save the loss of fertilizer inputs. संत्रा व मोसंबी: संत्रा व मोसंबीच्या १ वर्ष वयाच्या झाडास १०८ ग्राम युरिया आणि ४५ ग्राम म्युरेट ऑफ पोटाश द्यावे. दोन वर्ष वयाच्या झाडास दुप्पट, तीन वर्ष वयाच्या झाडास तिप्पट आणि चार वर्ष वयाच्या झाडास चौपट खताची मात्रा द्यावी. खतांची मात्रा देताना जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा असेल याची खात्री करावी जेनेकरून खताचे होणारे नुकसान टाळता येईल.
SWEET ORANGE	Sweet orange: Apply 500 gm urea, 600 gm single super phosphate, 150 gm muriate of potash along with 100 gm zinc sulphate, 100 gm ferrous sulphate, 100 gm manganese sulphate and 50 gm borax per tree to the orange plant where the fruit beard. मोसंबी: मोसंबी पिकाच्या ज्या झाडावर फळ आले आहे त्या झाडाला ५०० ग्राम युरिया, ६०० ग्राम सिंगल सुपर फोस्फेट, १५० ग्राम म्युरेट ऑफ पोटाश सोबत १०० ग्राम झिंक सल्फेट, १०० ग्राम फेरस सल्फेट, १०० ग्राम मँगनीज सल्फेट आणि ५० ग्राम बोरेक्स प्रती झाड या प्रमाणे द्यावे.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock(Varieties)	Live Stock Specific Advisory
COW	Fodder crop: Lucerne and Berseem fodder crops should be planted by the end of November for availability of nutritious fodder for animals. चारा पिके: जनावरांसाठी पोषक चारा उपलब्धतेसाठी लुसर्न आणि बरसीम या चारा पिकाची नोव्हेंबर महिना अखेर लागवड करावी.

Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory:

Others (Soil / Land Preparation)(Varieties)	Others (Soil / Land Preparation) Specific Advisory
GENERAL ADVICE	Farmers should take necessary precautionary measures while spraying insecticide, fungicide etc. शेतकरी बांधवांनी कीटकनाशके, बुरशीनाशके इत्यादींची फवारणी करताना स्वतःची योग्य ती काळजी/खबरदारी घ्यावी.